

Подготовка препаратом **ПИКОПРЕП**
(исследование после полудня)

Препарат принимается внутрь. За день до проведения процедуры рекомендуется снизить количество приемов пищи. Во избежание обезвоживания во время приема препарата **Пикопреп®** рекомендуется соблюдать питьевой режим.

Содержимое одного пакетика растворяют в 150 мл воды, перемешивают 2-3 минуты, охлаждают до приемлемой температуры и выпивают.

Взрослые и дети старше 9 лет:

За 2 дня до начала подготовки к исследованию - **бесшлаковая диета**

Накануне исследования:

Утром – бесшлаковая диета

Содержимое первого пакетика принимают вечером (в 17-21 час) в день, предшествующий процедуре, выпивая при этом не менее 5 стаканов по 250 мл воды или прозрачной жидкости по 1 стакану через каждые 15-20 минут.

Содержимое второго пакетика принимают утром (за 5-9 часов до процедуры), выпивая при этом не менее 3 стаканов по 250 мл воды или прозрачной жидкости по 1 стакану через каждые 15-20 минут. Последний прием жидкости не позднее, чем за 4 часа до процедуры.

Эспумизан принести с собой и принять 1 мерный колпачок, не запивая водой, за 15 минут до исследования (в эндоскопическом отделении). Кроме того, на исследование принести с собой простыню, гель «Катеджель», ЭКГ (если процедура выполняется в условиях медикаментозного сна), имеющуюся медицинскую документацию, касающуюся ранее выполненных колоноскопий или перенесенных операций на толстой кишке, при необходимости - анализы крови.